

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan kepatuhan minum obat terhadap kadar glukosa darah puasa pasien diabetes melitus tipe II di RSUD Kabupaten Subang, yang telah dibahas sebelumnya memiliki korelasi yang signifikan antara dua variabel dengan arah korelasi negatif. Dengan demikian, jika tingkat kepatuhan pengobatan cukup rendah, kadar glukosa darah pasien diabetes melitus tipe II akan meningkat.

5.2 Saran

Menurut penelitian yang dilakukan, peneliti mengusulkan :

1. Bagi rumah sakit

Tenaga kesehatan terutama Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian dapat mengedukasi mengenai pentingnya menjaga sikap patuh minum obat dalam melakukan pengobatan terutama pada individu yang memiliki diabetes melitus tipe II.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian ini lebih dalam apabila akan meneliti tentang kepatuhan pengobatan dan gula darah puasa, diharapkan lebih memperhatikan waktu puasa pasien pada saat pemeriksaan kadar glukosa darah puasa untuk menghindari bias dalam penelitian.