

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

1. Berdasarkan temuan dari penelitian Evaluasi Penggunaan Obat Diare Akut pada Pasien Anak di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit X daerah Bintaro Jaya periode Januari hingga Maret 2024, dapat disimpulkan bahwa kasus diare akut lebih umum terjadi pada anak laki-laki, mencakup 30 pasien atau sekitar 60%. Terapi obat diare akut yang umum digunakan melibatkan penggunaan probiotik oleh 43 pasien (40,56%), diikuti oleh pemberian suplemen zinc pada 40 pasien (37,73%), dan penggunaan antibiotik cefixime pada 8 pasien (7,53%).
2. Penggunaan obat diare akut pada anak diukur dari segi kerasionalitas dengan mempertimbangkan kriteria seperti tepat indikasi (100%), tepat obat (100%), tepat pasien (100%), dan tepat dosis (92%).

5.2.Saran

1. Diperlukan peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara tenaga kesehatan di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat, guna meningkatkan pelayanan kepada pasien. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan kepada pasien adalah tepat, efektif, dan aman.
2. Petugas kesehatan sebaiknya dianjurkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengobatan standar yang telah ditetapkan.