

Profil Peresepan Penggunaan Obat Anti Hipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Di Rumah Sakit PTPN VIII Subang

ABSTRAK

Hipertensi sering disebut juga sebagai *silent killer* karena penyakit ini tidak memiliki gejala yang spesifik, dapat menimbulkan penyakit degenerative, hingga kematian. seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil penggunaan obat antihipertensi pada pasien Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam di Rumah sakit PTPN VIII bulan Oktober 2023. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian survey deskriptif yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari data sekunder yang diambil langsung dari resep pada penderita hipertensi di Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam bulan Oktober tahun 2023. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin paling banyak menderita hipertensi pada pasien perempuan, pada rentang usia ≥ 50 tahun. Obat antihipertensi tunggal yang paling banyak digunakan adalah amlodipine dengan presentase sebesar 63,72%, golongan obat antihipertensi terbanyak adalah antagonis kalsium sebesar 41,65%, dan obat antihipertensi kombinasi terbanyak adalah amlodipine dan candesartan sebesar 25,17%. Kesimpulan pada penelitian ini adalah obat antihipertensi yang paling banyak diresepkan sebagai antihipertensi tunggal yaitu amlodipine dan sebagai antihipertensi kombinasi yaitu amlodipine dan candesartan.

Kata kunci : Anti Hipertensi, Amlodipine dan Candesartan, Rumah Sakit

Prescription Profile Of Anti-Hypertension Drug Use In Outpatients At The Internal Medicine Specialist Polyclinic At PTPN VIII Subang Hospital

ABSTRACT

Hypertension is often referred to as the silent killer because this disease has no specific symptoms and can cause degenerative diseases and even death. someone who experiences an increase in blood pressure above normal, namely systolic blood pressure ≥ 140 mmHg and/or diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg. The aim of this research is to determine the profile of antihypertensive drug use in patients at the Internal Medicine Specialist Polyclinic at PTPN VIII Hospital in October 2023. The research design used in this research is a descriptive survey research design, namely a quantitative research procedure. Quantitative data was obtained from secondary data taken directly from prescriptions for hypertension sufferers at the Internal Medicine Specialist Polyclinic in October 2023. The research results showed that the characteristics of patients based on gender mostly suffered from hypertension in female patients, in the age range ≥ 50 years. The most widely used single antihypertensive drug is amlodipine with a percentage of 63.72%, the most common class of antihypertensive drugs is calcium antagonists at 41.65%, and the most common combination antihypertensive drugs are amlodipine and candesartan at 25.17%. The conclusion of this study is that the antihypertensive drug most commonly prescribed as a single antihypertensive is amlodipine and as a combination antihypertensive, namely amlodipine and candesartan.

Keywords: Anti-Hypertension, Amlodipine and Candesartan, Hospital