

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah uraikan pada bab sebelumnya mengenai “Gambaran Skala Nyeri Pada Pasien Kuretase Pasca Anestesi Umum Dengan Analgetik Suppositoria di RSUD Kota Bandung” dengan jumlah responden sebanyak 32 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian berdasarkan skala nyeri NRS menunjukan responden sebagian besar mengalami nyeri ringan sebanyak 19 responden (59,4%), responden yang mengalami nyeri sedang sebanyak 13 responden (40,6%) dan tidak satupun responden yang mengalami nyeri berat dan tidak nyeri.
2. Hasil penilaian nyeri pasca operasi kuretase ini dilakukan pada 6 jam awal saat menjelang DOA Ketoprofen Suppositoria habis dan efek yang disebabkan oleh ketamin sudah benar-benar hilang. Sehingga efek dari ketoprofen ssuppositoria sangat efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, berikut beberapa saran yang akan peneliti jabarkan:

1. Bagi institusi RSUD Kota Bandung
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi RSUD Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kesehatan pada penanganan manajemen nyeri pasien pasca kuretase secara farmakologis dengan menyesuaikan tingkat nyeri dan indikasi kuretase.
2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan Anestesiologi
Hasil diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan materi pokok terhadap penanganan nyeri yang dirasakan pada pasien kuretase pasca anestesi umum seperti karakteristik umur dan indikasi yang memiliki faktor meningkatnya rasa nyeri pasca operasi kuret.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadikan penelitian ini sebagai data awal dalam penelitian lanjutan dan dapat dikembangkan dengan variabel lain seperti faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri lainnya. Kemudian peneliti dapat membandingkan tingkat nyeri dengan kombinasi analgetik yang berbeda.